

BLUEGUARD® IPN+SRS+AS+VO+ISA

Vacuna inactivada contra Necrosis Pancreática Infecciosa, Síndrome Rickettsial del Salmón, Furunculosis producida por *Aeromonas salmonicida* atípica, Vibriosis producida por *Vibrio ordalii*, y subunitaria contra Anemia Infecciosa del Salmón

Vacunas - Emulsión Inyectable

REG. SAG N° 2629 - B



Vacunas

COMPOSICIÓN

Cada dosis contiene:

<i>Piscirickettsia salmonis</i> , Cepa PS 2C	10 ^{8,5} – 10 ^{8,8} Bact
Virus de la Necrosis Pancreática Infecciosa, Cepa Sp221Ala, Serotipo Sp	10 ^{7,0} – 10 ^{7,5} TCID ₅₀
Virus de la Necrosis Pancreática Infecciosa, Cepa Sp221Thr, Serotipo Sp	10 ^{7,0} – 10 ^{7,5} TCID ₅₀
<i>Vibrio ordalii</i> , Cepa VO44-O3	10 ^{7,0} – 10 ^{7,5} Bact
<i>Aeromonas salmonicida</i> atípica, Cepa AS-O1	10 ^{7,0} – 10 ^{7,3} Bact
Proteína recombinante (hemaglutinina) de virus ISA, Cepa ISAO1	5,4 – 8,1 µg
Proteína recombinante (neuraminidasa) de virus ISA, Cepa ISAO1	5,4 – 8,1 µg
Excipientes c.s.p.	0,1 mL

-Inactivante: Formaldehído.

-Adyuvantes: Adyuvante oleoso no mineral.

PROPIEDADES INMUNOLÓGICAS

Para estimular la inmunidad activa contra el virus de la Necrosis Pancreática Infecciosa (Serotipo Sp), *Piscirickettsia salmonis*, *Aeromonas salmonicida* atípica, *Vibrio ordalii*, y virus de la Anemia Infecciosa del Salmón.

ESPECIES DE DESTINO

Salmón del Atlántico (*Salmo salar*).

INDICACIONES DE USO

Inmunización activa, como ayuda en la prevención de la Necrosis Pancreática Infecciosa, producida por virus IPN Serotipo Sp, Síndrome Rickettsial del Salmón, Furunculosis producida por *Aeromonas salmonicida* atípica, Vibriosis producida por *Vibrio ordalii* y Anemia Infecciosa del Salmón.

Duración de la inmunidad: protege a lo menos 650 UTA.

POSOLOGÍA, EDAD O PESO, CONDICIÓN FISIOLÓGICA, VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y MODO DE EMPLEO

Dosis: 0,1 mL.

Frecuencia: Dosis única.

Edad o peso: A partir de los 30 gramos.

Condición fisiológica: Peces sanos.

Vía de administración: Intraperitoneal.

Modo de empleo:

•Se recomienda dejar a los peces en ayuno mínimo 48 horas previas a la vacunación.

•Se recomienda que la temperatura del agua al momento de la vacunación se encuentre entre 10 y 13 °C.

•Anestesiarse los peces antes de la vacunación.

•Agitar fuertemente los frascos antes y durante su uso.

•Administrar en forma aséptica.



CONTRAINDICACIONES

No administrar en peces enfermos, o que estén cursando algún cuadro inmunosupresor. No administrar en peces reproductores. No administrar durante el periodo de esmoltificación. No vacunar peces con un peso menor a 30 gramos.

EFFECTOS ADVERSOS O REACCIONES ADVERSAS

Ocasionalmente, se puede producir algún grado de adherencia y/o pigmentación en el interior de la cavidad abdominal, cercana al punto de inoculación.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

Mantener fuera del alcance de los niños.

Se recomienda no vacunar con temperaturas bajo el rango de los 5 - 6 °C.

Los peces no deben ser trasladados a mar antes de **600 UTA** post vacunación.

INTERACCIÓN CON OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS CUANDO SON ADMINISTRADOS EN FORMA CONCOMITANTE

No existe información disponible respecto de la seguridad y eficacia para el uso concomitante con otros productos farmacéuticos, por lo cual no se recomienda administrar otros productos 14 días previos y posteriores a la inmunización.

SOBREDOSIS

No se han observado efectos indeseables en peces vacunados con el doble de la dosis recomendada. No se recomienda sobredosificar.

PERIODO DE RESGUARDO

Cero días.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL OPERADOR

La inyección accidental con este producto puede provocar reacciones adversas en el punto de inoculación. Se recomienda su aplicación con pistola multidosis y con horquilla de protección.

En caso de inyección accidental del operador, acudir al centro asistencial más cercano.

PRINCIPALES INCOMPATIBILIDADES FÍSICAS O QUÍMICAS CON OTROS PRODUCTOS CON LOS CUALES ES NORMALMENTE DILUIDO, MEZCLADO O COADMINISTRADO

No diluir, mezclar o coadministrar con ningún producto farmacéutico.

PERIODO DE EFICACIA (ESTABILIDAD)

18 meses a partir de la fecha de elaboración.

Utilizar inmediatamente una vez abierto el frasco y descartar el producto sobrante.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Mantener refrigerado entre 2 y 8 °C. No congelar.

DESCRIPCIÓN DE LOS ENVASES

Frasco de polietileno de alta densidad, etiquetado, cerrado con tapón de goma y precinto de aluminio y plástico, conteniendo 250 o 500 mL, correspondiente a 2.500 o 5.000 dosis.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA DISPOSICIÓN DEL PRODUCTO SIN UTILIZAR O EL MATERIAL DE DESECHO

Se recomienda utilizar todo el contenido del envase una vez abierto.

No conservar frascos con remanente de producto no utilizado.

Para eliminar los envases y desechos se recomienda la incineración.

Venta bajo Receta Médico Veterinaria.

USO VETERINARIO

