

VIRBAC FELIGEN[®] C.R.P.

Vacunas – Polvo Liofilizado para reconstituir
Suspensión Inyectable



REG. SAG N° 1586 – B

COMPOSICIÓN

Cada dosis reconstituida contiene:

Calicivirus Felino, Cepa F9

Virus de la Rinotraqueítis Felina, Cepa F2

Virus de la Panleucopenia Felina, Cepa LR72

Excipientes c.s.p.

$10^{4,6}$ a $10^{6,1}$ CCID₅₀

$10^{5,0}$ a $10^{6,6}$ CCID₅₀

$10^{3,7}$ a $10^{4,5}$ CCID₅₀

1 mL

PROPIEDADES INMUNOLÓGICAS

Para estimular la inmunidad activa contra Calicivirus Felino, el virus de la Rinotraqueítis Infecciosa Felina y de la Panleucopenia Felina.

ESPECIES DE DESTINO

Gatos.

INDICACIONES DE USO

Inmunización activa, para reducir los signos clínicos de la Enfermedad Respiratoria Felina causada por Calicivirus Felino, reducir los signos clínicos y la excreción viral causada por el virus de la Rinotraqueítis Felina, y prevenir la leucopenia y reducir los signos clínicos causados por el virus de la Panleucopenia Felina.

POSOLOGÍA, EDAD O PESO, CONDICIÓN FISIOLÓGICA, VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN Y MODO DE EMPLEO

Dosis: 1 mL.

Frecuencia, intervalo y duración del tratamiento:

Primovacunación: Aplicar 1 dosis a partir de las 8 – 9 semanas de edad y repetir 3 – 4 semanas después.

Revacunación: Se aconseja revacunación anual con 1 dosis.

Edad o peso: A partir de las 8 – 9 semanas de edad.

Condición fisiológica: Gatos clínicamente sanos.

Vía de administración: Subcutánea.

Modo de empleo: Reconstituir la fracción liofilizada con el disolvente. Administrar en forma aséptica utilizando jeringas estériles. Agitar antes de usar.

CONTRAINDICACIONES

No administrar en hembras preñadas ni durante la lactancia.

EFFECTOS ADVERSOS O REACCIONES ADVERSAS

Ocasionalmente se pueden presentar reacciones locales y transitorias en el sitio de inyección, las cuales remiten espontáneamente.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Vacunar únicamente gatos en buen estado de salud y correctamente desparasitados.

Utilizar inmediatamente una vez reconstituida la vacuna.

INTERACCIÓN CON OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

No utilizar en forma concomitante con otros productos farmacéuticos, salvo con Virbac Rabigen[®] (REG. SAG N° 2276 – B).

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Mantener refrigerado: Entre 2 y 8 °C. No congelar.

PRESENTACIÓN

Envase de 10 dosis.

USO VETERINARIO

Venta bajo Receta Médico Veterinaria.