

CLINEXIN®

Ceftiofur clorhidrato 5,35%

Antibióticos - Suspensión Inyectable

REG. SAG N° 2058-B

COMPOSICIÓN

Cada 100 mL de producto contiene:	
Ceftiofur clorhidrato	5,35 g
(Equivalente a 5 g de Ceftiofur base)	
Excipientes c.s.p.	100 mL

ESPECIES DE DESTINO

Cerdos y Bovinos.

INDICACIONES DE USO

Tratamiento de enfermedades infecciosas causadas por gérmenes Gram positivos y Gram negativos (incluidos cepas productoras de betalactamasas) en cerdos y bovinos, tales como:

Cerdos: Enfermedad Respiratoria de los Cerdos (Neumonía Bacteriana o Pleuroneumonía), provocadas por *Pasteurella multocida*, *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Salmonella choleraesuis* y *Streptococcus suis*.

Bovinos: Enfermedad Respiratoria del Bovino ("Shipping fever" o Neumonía del Bovino) asociada a *Mannheimia haemolytica*, *Pasteurella multocida* e *Histophilus somni*, de la Necrobacilosis Interdigital del Bovino ("Foot-Rot" o Pododermatitis Necrótica) causado por *Fusobacterium necrophorum* (con o sin asociación de *Bacteroides melanogenicus*) y para el control de la metritis post-parto.

DOSIFICACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Dosificación:

Cerdos: 3 - 5 mg de Ceftiofur base/kg peso vivo/día (equivalente a 0,6 - 1 mL de Clinexin®/cada 10 kg peso vivo), por 3 días.

Bovinos: 1,1 mg de Ceftiofur base/kg peso vivo/día (equivalente a 2,2 mL de Clinexin®/cada 100 kg peso vivo), por 3 a 5 días.

Vía de administración:

Intramuscular, en la zona (o tabla) del cuello.

ADVERTENCIAS

Mantener fuera del alcance de los niños.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad al principio activo.

No administrar en hembras preñadas o en lactancia.

No administrar en animales reproductores.

EFFECTOS NO DESEADOS Y REACCIONES ADVERSAS

Reacción local transitoria en el sitio de inyección (dolor leve a moderado, calor y/o inflamación).

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Mantener a temperatura ambiente, entre 15 y 30°C, en un lugar seco y protegido de la luz solar.

Una vez abierto el producto, utilizar dentro de un mes y mantener bajo las mismas condiciones de almacenamiento ya mencionadas.

PERIODO DE RESGUARDO

Cerdos: 2 días.

Bovinos: Carne: 11 días

Leche: 0 días.

PRESENTACIÓN

Envases de 50 mL, 100 mL y 250 mL.

Venta bajo Receta Médico Veterinaria

USO VETERINARIO



FT0123NAC13082019R1V1

