

CONTRALAC® 20

Antigalactogénico no hormonal

Comprimido Oral

Reg. SAG N° 1581

COMPOSICIÓN

Cada comprimido contiene:

Metergolina 2,0 mg
Excipiente c.s.p. 220 mg

ESPECIES DE DESTINO

Perros.

INDICACIONES DE USO

Contralac® 20 está indicado para interrumpir la lactancia de pseudopreñez y de post-parto.

DOSIFICACIÓN, VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y MODO DE EMPLEO

0,1 mg/Kg de peso cada 12 horas, durante 8 días.

Tabla de dosificación

Peso del animal	Contralac® 20
10 Kg	½ comprimido cada 12 horas
20 Kg	1 comprimido cada 12 horas
30 Kg	1 ½ comprimido cada 12 horas
40 Kg	2 comprimidos cada 12 horas

Los comprimidos se administran por vía oral, calculando la dosis según el peso del animal. Para algunos animales que no responden al tratamiento en los primeros (8) ocho días, puede ser necesario continuar el tratamiento por 4 a 8 días más.

ADVERTENCIAS

Mantener fuera del alcance de los niños.

CONTRAINDICACIONES Y EFECTOS NO DESEADOS

Puede presentarse vómitos o diarrea moderados y modificaciones del comportamiento (agitación); estos efectos son raros y desaparecen al interrumpir el tratamiento.

No administrar en hembras gestantes.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Mantener a temperatura ambiente: entre 15 – 30 °C.

PRESENTACIÓN

Estuche con 2 blisters con 8 comprimidos cada uno.

USO VETERINARIO

Venta bajo Receta Médico Veterinaria



Antigalactogénico

FT0131NAC23082019R1/V1

Fabricado por:
Virbac S.A.
13 ème Rue LID O6517 Carros
Cedex - Francia

Importado y distribuido por:
Centrovét Ltda.
Av. Los Cerrillos 602, Cerrillos - Santiago, Chile.
Teléfono: (56-2) 2583 77 00 Fax: (56-2) 2583 7701
e-mail: centrovét@centrovét.com - www.centrovét.com
Bajo licencia de Virbac S.A., Francia

