

# EHLIQUANTEL®

## Antiparasitarios - Comprimidos Orales

REG. SAG N° 1337



### COMPOSICIÓN

Cada comprimido contiene:

Praziquantel	50 mg
Pirantel pamoato (Equivalente a 50 mg de Pirantel base)	144 mg
Febantel	150 mg
Excipientes c.s.p.	1 Comprimido

### ESPECIES DE DESTINO

Perros.

### INDICACIONES DE USO

Para el control de infestaciones causadas por tenias (*Echinococcus granulosus*, *Dipylidium caninum* y *Taenia* spp.), y nematodos (*Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*, *Uncinaria stenocephala*, *Ancylostoma caninum* y *Trichuris vulpis*), en el perro.

### DOSIFICACIÓN, VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y MODO DE EMPLEO:

**Dosificación:** La dosis a administrar es de 5 mg de Praziquantel/kg de peso corporal; 14,4 mg de Pirantel pamoato/kg de peso corporal y 15 mg de Febantel/kg de peso corporal; equivalente a 1 comprimido de Ehliquantel®/10 kg de peso corporal, como dosis única.

**Vía de administración:** Administrar directamente en la boca del animal o bien, junto con el alimento.

#### Modo de empleo:

**Cachorros y perros adultos de raza pequeña:**

¼ comprimido para perros de 1 a 2 kg de peso corporal, lo que en promedio corresponde a 8,3 mg de Praziquantel, 24 mg de Pirantel pamoato y 25 mg de Febantel por cada kg de peso corporal.

½ comprimido para perros de 2 a 5 kg de peso corporal, lo que en promedio corresponde a 7 mg de Praziquantel, 20,6 mg de Pirantel pamoato y 21,4 mg de Febantel por cada kg de peso corporal.

1 comprimido para perros de 5 a 10 kg de peso corporal, lo que en promedio corresponde a 6,7 mg de Praziquantel, 19,2 mg de Pirantel pamoato y 20 mg de Febantel por cada kg de peso corporal.

**Cachorros y perros adultos de raza mediana y grande:**

1 comprimido por cada 10 kg de peso corporal, lo que corresponde a 5 mg de Praziquantel, 14,4 mg de Pirantel pamoato y 15 mg de Febantel por cada kg de peso corporal.

Los perros mayores de 6 meses y los perros adultos, deben desparasitarse cada 3 meses. En zonas con *Echinococcus granulosus*, repetir la dosis única todos los meses mientras exista infestación positiva.

### ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

**Mantener fuera del alcance de los niños.**

### CONTRAINDICACIONES

No administrar en animales con hipersensibilidad conocida a alguno de los activos.

No administrar en animales con alteraciones hepáticas severas.

No administrar en animales severamente debilitados.

No utilizar en cachorros menores de 3 semanas de edad y con un peso menor a 1 kg de peso corporal.

No administrar en conjunto con Piperacina, ya que Pirantel pamoato tiene efecto antagónico con este fármaco, ni con Levamisol, ya que al compartir el mecanismo de acción con Pirantel pamoato, puede conducir a toxicidad.

No utilizar en hembras preñadas ni durante la lactancia.

No sobredosificar.



## EFFECTOS ADVERSOS Y REACCIONES ADVERSAS

Para Pirantel pamoato, cuando éste se utiliza en dosis recomendadas, los efectos adversos son improbables, no obstante, pueden presentarse vómitos.

Para Praziquantel, puede presentarse anorexia, vómito, letargia o diarrea, pero la incidencia de estos efectos es menor al 5%.

Para Febantel, y en combinación con Praziquantel, puede presentarse salivación, anorexia, vómitos o náuseas, y diarrea o heces blandas, sin embargo, la incidencia de estos efectos es menor al 3%.

## CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Mantener a temperatura ambiente: a no más de 25 °C, en un lugar seco y protegido de la luz solar. No refrigerar ni congelar.

## PRESENTACIÓN

Sachet conteniendo 1 comprimido de EHLIQUANTEL®.

## USO VETERINARIO

**Venta bajo Receta Médico Veterinaria.**

