

ENDOGARD® 30

Antiparasitarios - Comprimidos Orales

REG. SAG Nº 1993-B

COMPOSICIÓN

Cada tableta contiene:

| | |
|---|------------|
| Febantel | 450,0 mg |
| Pirantel pamoato (Equivalente a 150 mg de Pirantel base) | 432,0 mg |
| Praziquantel | 150,0 mg |
| Ivermectina | 0,18 mg |
| Excipientes c.s.p. | 2.700,0 mg |

ESPECIES DE DESTINO

Perros.

INDICACIONES DE USO

Tratamiento antiparasitario interno de amplio espectro que actúa contra nematodos gastrointestinales, cestodos y giardia.

Nematodos: *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*, *Ancylostoma caninum*, *Uncinaria stenocephala*, *Trichuris vulpis*, *Strongyloides stercoralis*.

Cestodos: *Dipylidium caninum*, *Echinococcus granulosus*, *Taenia pisiformis*, *T. hydatigena*, *T. serialis*, *T. multiceps*.

Protozoarios: *Giardia canis*.

DOSIFICACIÓN, VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y MODO DE EMPLEO

Dosificación: 15 mg de Febantel, 14,4 mg de Pirantel pamoato, 5 mg de Praziquantel y 6 µg de Ivermectina por kg de peso corporal.

Vía de administración: Administrar directamente por vía oral o con el alimento.

Modo de empleo: Administrar 1 tableta por cada 30 kg de peso corporal, como dosis única. Repetir cada 3 meses. Tratamiento contra *Giardia canis*: Administrar 1 tableta por cada 30 kg de peso corporal, cada 24 horas por 3 días.

ADVERTENCIAS

Mantener fuera del alcance de los niños.

CONTRAINDICACIONES

No administrar en cachorros menores de 6 semanas de edad.

No administrar en hembras gestantes ni lactantes.

EFFECTOS NO DESEADOS Y REACCIONES ADVERSAS

Ocasionalmente se puede presentar diarrea, cólico, depresión, incoordinación, temores, salivación y vómito, especialmente en cachorros menores de 4 semanas de edad.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Mantener a temperatura ambiente, entre 15 y 30° C, en lugar seco y protegido de luz solar.

Consérvese en su envase original, perfectamente cerrado.

PRESENTACIÓN

Envase con 2 tabletas.

USO VETERINARIO

Venta bajo receta Médico Veterinaria

