

ENROMIC® 10%

Antibióticos – Solución Oral

REG. SAG Nº 0110

COMPOSICIÓN

Cada 100 mL de producto contiene:
Enrofloxacino 10 g
Excipientes c.s.p. 100 mL

ESPECIES DE DESTINO

Pollos broiler, Pollas de reemplazo de ponedoras, Reproductoras, Pavos, Cerdos y Bovinos (Terberos pre-rumiantes).

INDICACIONES DE USO

Tratamiento de procesos infecciosos causados por gérmenes sensibles a Enrofloxacino, tales como:

Pollos broiler, Pollas de reemplazo de ponedoras, Reproductoras y Pavos: *Escherichia coli*, *Ornithobacterium*, *Salmonella*, *Pasteurella*, *Haemophilus*, *Staphylococcus* y *Mycoplasma*.

Cerdos: *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Pasteurella multocida*, *Haemophilus parasuis*, *Streptococcus suis*, *Mycoplasma hyopneumoniae* y *E. coli*.

Bovinos (Terberos pre-rumiantes): *Mannheimia haemolytica*, *Mycoplasma bovis*, *Pasteurella multocida*, *Histophilus somni*, *Salmonella* y *E. coli*.

DOSIFICACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Dosificación:

Pollos broiler, Pollas de reemplazo de ponedoras, Reproductoras y Pavos: 10 mg de Enrofloxacino/kg peso/día, equivalente a 0,1 mL de Enromic® 10%/kg de peso, durante 3 a 5 días.

Cerdos: 2,5 mg de Enrofloxacino/kg peso/día, equivalente a 0,25 mL de Enromic® 10%/10 kg de peso, durante 3 a 5 días.

Bovinos (Terberos pre-rumiantes): 2,5 a 5 mg de Enrofloxacino/kg peso/día, equivalente a 0,25 - 0,5 mL de Enromic® 10%/10 kg de peso, durante 3 a 5 días.

Vía de administración: Vía oral, en el agua de bebida.

ADVERTENCIAS Y CONTRAINDICACIONES

Mantener fuera del alcance de los niños

No administrar en animales con hipersensibilidad conocida al principio activo.

No emplear en animales con trastornos en el cartilago articular.

No administrar junto con AINES.

No administrar a terneros rumiantes.

No administrar en hembras preñadas, en lactancia ni durante la postura. No administrar en animales con hipersensibilidad conocida al principio activo.

No emplear en animales con trastornos en el cartilago articular.

No administrar en hembras preñadas, en lactancia ni durante la postura.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Mantener a temperatura ambiente, entre 15 y 30 °C, en un lugar seco y protegido de la luz solar.

PERÍODO DE RESGUARDO

Pollos broilers, Pollas de reemplazo de ponedoras y Reproductoras: 7 días.

Pavos: 10 días.

Cerdos y bovinos (Terberos pre-rumiantes): 10 días.

No administrar a gallinas en postura cuyos huevos sean destinados a consumo humano.

Venta bajo Receta Médico Veterinaria Retenida.

USO VETERINARIO

PRESENTACIÓN

Envases de 250 mL, 500 mL y 1000 mL y 10 L.



FT0047NAC07062019R1V1

