

EHLIFLOXACINO® 50

Antibióticos - Comprimidos Orales

Reg. SAG N° 1391

COMPOSICIÓN

Cada comprimido contiene:

Enrofloxacinó 50 mg
Excipientes c.s.p. 1 Comprimido

ESPECIES DE DESTINO

Perros y Gatos.

INDICACIONES DE USO

Enrofloxacinó presenta amplia actividad contra bacterias Gram negativas y Gram positivas, indicándose para el tratamiento de infecciones bacterianas de los sistemas:

Respiratorio: causadas por *Pasteurella* spp., *Bordetella* spp., y *Klebsiella* spp.

Gastrointestinal: causadas por *Escherichia coli*, *Salmonella* spp., y *Proteus* spp.

Urogenital (nefritis, pielonefritis, cistitis y prostatitis): causadas por *Escherichia coli*, *Corynebacterium piogenes*, y algunas cepas de *Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp., y *Pseudomonas aeruginosa*.

Infecciones cutáneas (como dermatitis, piodermas y heridas infectadas): causadas por *Escherichia coli*, *Klebsiella* spp., y algunas cepas de *Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp., y *Pseudomonas aeruginosa*.

Infecciones del conducto auditivo (otitis): causadas por *Escherichia coli* y algunas cepas de *Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp., y *Pseudomonas aeruginosa*.

DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Dosificación:

5 mg de Enrofloxacinó/kg de peso corporal/24 horas (equivalente a 1 comprimido de Ehlifloxacinó® 50 mg/10 kg de peso corporal/24 horas), o 2,5 mg de Enrofloxacinó/kg de peso corporal/12 horas (equivalente a ½ comprimido de Ehlifloxacinó® 50 mg/10 kg de peso corporal/12 horas), durante 5 a 14 días.

En infecciones complicadas o crónicas, susceptibles a Enrofloxacinó, el tratamiento puede extenderse por varias semanas.

Vía de administración: Vía oral.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

Mantener fuera del alcance de los niños.

El uso de Fluoroquinolonas debe ser reservado para el tratamiento de aquellos casos clínicos que hayan respondido de forma escasa, o cuando se espera que no respondan a otra clase de antimicrobiano.

Las Fluoroquinolonas no deben utilizarse como primera línea de tratamiento, a menos que esté justificado. Sólo deben utilizarse, en lo posible, en base a pruebas de susceptibilidad.

El uso del producto en condiciones distintas a las recomendadas, puede incrementar la prevalencia de bacterias resistentes a las Fluoroquinolonas y disminuir la eficacia del tratamiento con otras Quinolonas, debido a la resistencia cruzada.

CONTRAINDICACIONES

No administrar en animales con hipersensibilidad conocida a las Quinolonas.

No administrar en perros de razas pequeñas y medianas, menores de 12 meses de edad.

No administrar en perros de razas grandes, menores de 18 meses de edad.

No administrar en gatos menores de 8 semanas de edad.

No emplear en animales con trastornos del cartílago articular.

No utilizar en animales con afecciones del sistema nervioso central, ni con daño hepático o renal severo.

No administrar en hembras preñadas o durante la lactancia de los cachorros o gatitos.



CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Mantener a temperatura ambiente: a no más de 25 °C, en un lugar seco y protegido de la luz solar. No refrigerar ni congelar. Conservar en su envase original, bien cerrado.

PRESENTACIÓN

Estuche conteniendo un blíster con 10 Comprimidos Orales.

USO VETERINARIO

Venta bajo Receta Médico Veterinaria Retenida.

FT0132NAC110124R2/V1

