

EHLIFLOXACINO® 150

Antibióticos - Comprimidos Orales



REG. SAG N° 1674

COMPOSICIÓN

Cada comprimido contiene:
Enrofloxacin 150 mg
Excipientes c.s.p. 1 Comprimido

ESPECIES DE DESTINO

Perros.

INDICACIONES DE USO

Para el tratamiento de perros grandes con infecciones bacterianas de los sistemas:

Respiratorio: causadas por *Pasteurella* spp., *Bordetella* spp., *Klebsiella* spp.

Gastrointestinal: causadas por *Escherichia coli*, *Salmonella* spp., y *Proteus* spp.

Urogenital (nefritis, pielonefritis, cistitis y prostatitis): causadas por *Escherichia coli*, *Corynebacterium pyogenes*, y algunas cepas de *Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp., y *Pseudomonas aeruginosa*.

Infecciones cutáneas (dermatitis, piодermas y heridas infectadas): causadas por *Escherichia coli*, *Klebsiella* spp., y algunas cepas de *Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp., y *Pseudomonas aeruginosa*.

Infecciones del conducto auditivo (otitis): causadas por *Escherichia coli* y algunas cepas de *Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp. y *Pseudomonas aeruginosa*.

DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Dosis, frecuencia y duración del tratamiento:

2,5 mg de Enrofloxacin/kg de peso corporal/12 horas (equivalente a ½ comprimido de Ehlifloxacin® 150 mg/30 kg de peso corporal/12 horas), o 5 mg de Enrofloxacin/kg de peso corporal/24 horas (equivalente a 1 comprimido de Ehlifloxacin® 150 mg/30 kg de peso corporal/24 horas), durante 5 a 14 días. El tratamiento debe continuar por un mínimo de 2 a 3 días, luego del cese de las manifestaciones clínicas.

En infecciones complicadas o crónicas, susceptibles a Enrofloxacin, el tratamiento puede extenderse por varias semanas.

Vía de administración: Vía oral.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

Mantener fuera del alcance de los niños.

El uso de Fluoroquinolonas debe ser reservado para el tratamiento de aquellos casos clínicos que hayan respondido de forma escasa, o cuando se espera que no respondan a otra clase de antimicrobiano.

Las Fluoroquinolonas, como Enrofloxacin, no deben utilizarse como primera línea de tratamiento, a menos que esté justificado. Sólo deben utilizarse, en lo posible, en base a pruebas de susceptibilidad.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a las Quinolonas.

No administrar en perros de razas pequeñas y medianas, menores de 12 meses de edad.

No administrar en perros de razas grandes, menores de 18 meses de edad.

No administrar en animales con trastornos del cartilago articular.

No administrar en animales con afecciones del sistema nervioso central, ni con daño hepático o renal severo.

No administrar en hembras preñadas o durante la lactancia de los cachorros.



EFFECTOS ADVERSOS Y REACCIONES ADVERSAS

El principal efecto adverso corresponde a artropatías, debido al uso en animales muy jóvenes, especialmente en los perros. El riesgo aumenta con dosis altas, pero también se ha reportado a dosis recomendadas (perros jóvenes). Se ha observado daño en el cartílago articular de cachorros de 10 a 28 semanas de edad, al utilizar dosis orales de 5 - 25 mg de Enrofloxacin/kg de peso corporal/día, por 30 días.

Otros efectos adversos posibles, corresponden principalmente a anorexia/disminución del apetito, vómitos, diarrea o reacciones de hipersensibilidad.

Si se presentan estos signos, solicitar asistencia Médico Veterinaria.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Mantener a temperatura ambiente, entre 15 y 30 °C, en un lugar seco y protegido de la luz solar.

PRESENTACIÓN

Estuche conteniendo un blíster con 10 Comprimidos Orales.

USO VETERINARIO

Venta bajo Receta Médico Veterinaria Retenida.

