# FUROCICLINA® 4,4%

**Lincomicina 4,4%**

Antibióticos – Polvo Oral

## Reg. SAG N° 1415-B

## COMPOSICIÓN

Cada 100 g de producto contiene:

| | |
|---|---|
| Lincomicina clorhidrato | 4,99 g |
| (Equivalente a 4,40 g de Lincomicina base) | |
| Excipientes c.s.p. | 100 g |

## ESPECIES DE DESTINO

Aves (Pollos broiler) y Cerdos.

## INDICACIONES DE USO

Aves: Para el tratamiento de Enteritis Necrótica causada por *Clostridium* spp., y otros organismos sensibles a Lincomicina.
Cerdos: Para el tratamiento de Disentería Porcina y Neumonía Porcina causada por *Mycoplasma hyopneumoniae*.

## DOSIFICACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

**Dosificación:**
**Aves:** 0,2 – 0,4 mg de Lincomicina base/kg de peso vivo, por 7 días consecutivos, equivalentes a 40 – 80 g de Furociclina® 4,4% por tonelada de alimento.

**Cerdos:** En forma general, las dosis son las siguientes:
Tratamiento de Disentería Porcina: 3 - 5 mg de Lincomicina base/kg de peso vivo, durante 21 días consecutivos, equivalentes a 1.000 – 2.000 g de Furociclina® 4,4% por tonelada de alimento.
Tratamiento de Neumonía Micoplásmica: 8 - 10 mg de Lincomicina base/kg de peso vivo, durante 21 días consecutivos, equivalentes a 5.000 g de Furociclina® 4,4% por tonelada de alimento.

**Vía de administración:** Vía oral, en el alimento.

## ADVERTENCIAS Y CONTRAINDICACIONES

**Mantener fuera del alcance de los niños**
Se recomienda no administrar en forma concomitante con Clindamicina, Eritromicina o Caolín.
Se recomienda no administrar a hembras en gestación, animales en lactancia o reproductores.
No administrar a animales con conocida hipersensibilidad a Lincomicina.
No administrar a cerdos con peso superior a 113 kg.

## CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Mantener a temperatura ambiente, entre 15 y 30 °C, en un lugar seco y protegido de la luz solar.

## PERIODO DE RESGUARDO

**Aves:** 0 días.
**Cerdos:** 6 días.
No administrar a aves de postura cuyos huevos se destinen a consumo humano.

**Venta bajo Receta Médico Veterinaria.**

## USO VETERINARIO

## PRESENTACIÓN

Bolsas de 5 kg y 25 kg.

FT0053NAC07062019R1V1

Fabricado y Comercializado en Chile por Centrovet Ltda.
Av. Los Cerrillos 602, Cerrillos, Santiago
Central: (56 2) 5837700, Fax: (56 2) 5837701 / 5331186
e-mail: centrovet@centrovet.com, www.centrovet.com