

KALMAGIN® 20%

Anestésicos – Uso Externo

Reg. SAG N° 1404

COMPOSICIÓN

Cada 100 mL de producto contiene:

Benzocaína	20 g
Excipientes c.s.p.	100 mL

ESPECIES DE DESTINO

Salmónidos.

INDICACIONES DE USO

Kalmagin® 20% Solución Externa para Inmersión está indicado para el manejo de peces (sedación y anestesia) durante el transporte, desove, vacunación, aplicación de medicamentos, clasificación, pesaje y medición de peces, y recuento parasitario (piojos).

DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Dosis: 15 a 20 mL de Kalmagin® 20% Solución Externa para Inmersión en 100 litros de agua fresca.

Modo de empleo: Para realizar el baño de inmersión, diluir 15 a 20 mL de Kalmagin® 20% Solución Externa para Inmersión, por cada 100 litros de agua fresca. El tiempo para lograr un estado en que el pez sea completamente manipulable, se alcanza aproximadamente a los 3 minutos iniciada la inmersión.

Para una rápida recuperación de los peces anestesiados, se recomienda su traslado a estanques o recipientes con agua limpia y fresca o hacer el recambio de agua en el mismo contenedor, controlando la concentración de oxígeno y observando el comportamiento de los peces.

El uso del producto está destinado al manejo de peces en contenedores cerrados ya que el agua tratada no debe estar en contacto con cursos de agua naturales.

PERIODO DE RESGUARDO

210 grados días.

CONTRAINDICACIONES

No aplicar por más de 15 minutos, ya que podría ser letal.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL OPERADOR:

Evitar el contacto con la piel y ojos. Se recomienda utilizar guantes, gafas y ropa protectora durante la manipulación del producto. En caso de ingestión accidental, buscar atención médica inmediatamente.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Mantener a temperatura ambiente, entre 15 y 30 °C, en un lugar seco y protegido de la luz solar.

PRESENTACIÓN

Envases de 1 y 5 L.

USO VETERINARIO

Venta bajo Receta Médico Veterinaria

