

KERTESIN® PERRO

Prednisolona 20 mg

Antiinflamatorios – Comprimidos Orales

REG. SAG N° 1697



COMPOSICIÓN

Cada comprimido contiene:

Prednisolona 20 mg
Excipientes c.s.p. 1 comprimido

ESPECIES DE DESTINO

Perros.

INDICACIONES DE USO

Procesos inflamatorios y alérgicos donde esté indicado el uso de Glucocorticoides. Enfermedades autoinmunes (Lupus eritematoso, enfermedades penfigoideas). Coadyuvante en la terapia antineoplásica (neoplasias linfoides).

DOSIFICACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Dosificación:

Terapia de sustitución: 0,25 mg de Prednisolona/kg de peso corporal/día, equivalente a $\frac{1}{2}$ comprimido por cada 40 kg de peso corporal. En estado de estrés, aumentar la dosis 2 a 5 veces. Restringir la terapia de sustitución sólo en perros sobre 20 kg de peso corporal.

Procesos inflamatorios y alérgicos: 0,5 - 1 mg de Prednisolona/kg de peso corporal/día, equivalente a $\frac{1}{2}$ y 1 comprimido, respectivamente, por cada 20 kg de peso corporal. En tratamientos prolongados se debe realizar la terapia en días alternos. Este tratamiento evita la supresión del eje hipotálamo-hipófisis-adrenal, permitiendo la recuperación en los días en que no se administra la Prednisolona.

Enfermedades autoinmunes y coadyuvante de terapia antineoplásica: 2 - 4 mg de Prednisolona/kg de peso corporal/día, equivalente a $\frac{1}{2}$ y 1 comprimido, respectivamente, por cada 5 kg de peso corporal.

Esquema terapéutico:

0,5 a 1 mg de Prednisolona/kg de peso corporal/12 horas (dosis de inducción), equivalente a $\frac{1}{2}$ y 1 comprimido, respectivamente, por cada 20 kg de peso corporal, por 5 a 7 días.

Continuar con 1 - 2 mg de Prednisolona/kg de peso corporal, una vez al día cada 48 horas, equivalente a 1 y 2 comprimidos respectivamente, cada 20 kg de peso corporal, durante 7 días. Se continúa reduciendo semanalmente la cantidad de Prednisolona (siempre días alternos) hasta llegar a una dosis mínima de mantenimiento, pero de efecto terapéutico buscado.

No interrumpir en forma súbita la administración, sino gradualmente.

Vía de administración: Vía oral.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

Mantener fuera del alcance de los niños.

Evitar el término abrupto del tratamiento. Para esto preferir retiro paulatino y terapia en días alternos.

Utilizar la dosis mínima que permita alcanzar el efecto deseado.

Monitorear la aparición de síntomas relacionados con Hiperadrenocorticismos, como poliuria, polidipsia, polifagia y jadeo.

Utilizar con precaución en perros jóvenes, diabéticos, hipertensos e inmunodeprimidos

CONTRAINDICACIONES

No administrar en hembras preñadas o durante la lactancia de los cachorros.

No administrar en animales reproductores.

No usar en cuadros de infecciones bacterianas, virales o micóticas sistémicas.

No usar en animales con úlceras gastrointestinales, corneales o en cuadros de Hiperadrenocorticismos (Síndrome de Cushing).

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Mantener a temperatura ambiente, entre 15 y 30 °C, en un lugar seco y protegido de la luz solar.

PRESENTACIÓN

Envase con 10 comprimidos.

USO VETERINARIO

Venta bajo Receta Médico Veterinaria.

FT0134NAC08012025R2V2

