

# KERTESIN® GATO

**Prednisolona 20 mg**

**Antiinflamatorios – Comprimidos Orales**

**REG. SAG N° 2555**

## COMPOSICIÓN

Cada comprimido contiene

Prednisolona

20 mg

Excipientes c.s.p.

1 Comprimido

## ESPECIES DE DESTINO

Gatos.

## INDICACIONES) DE USO

Procesos inflamatorios y alérgicos en los que se recomienda el uso de Corticoides, y enfermedades inmunomediadas o autoinmunes como Pénfigo Foliáceo.

## DOSIFICACIÓN, VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y MODO DE EMPLEO

### Dosificación:

Antiinflamatorio y cuadros alérgicos (Fase inducción): 1 - 2 mg de Prednisolona/kg de peso corporal/día (equivalente a  $\frac{1}{4}$  a  $\frac{1}{2}$  comprimido de Kertesin® Gato/5 kg de peso corporal/día) por 3 - 7 días, de acuerdo a la evaluación del Médico Veterinario tratante.

Inmunesupresor (Fase inducción): 2 - 4 mg de Prednisolona/kg de peso corporal/una o dos veces al día (equivalente a  $\frac{1}{2}$  a 1 comprimido de Kertesin® Gato/5 kg de peso corporal/una o dos veces al día) por 10 - 28 días. Luego, disminuir la dosis gradualmente tan pronto el cuadro lo permita, de acuerdo a evaluación del Médico Veterinario tratante.

Vía de administración: Vía oral.

### Modo de empleo:

La disminución de la dosis se debe realizar una vez alcanzado el efecto deseado. Se recomienda reducir 25% la dosis administrada de forma progresiva, paulatina, por la misma cantidad de días usados en la fase de inducción. Al alcanzar dosis de 0,25 - 0,5 mg/kg, administrar en días alternos.

## ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

### Mantener fuera del alcance de los niños.

El tratamiento con Prednisolona debe ser complementario al tratamiento de la patología de base y/o a las medidas de control ambiental.

En caso de infecciones bacterianas, utilizar Prednisolona sólo como complemento a la terapia antibiótica instaurada y habiendo realizado el diagnóstico de la patología de base.

La dosis y duración total del tratamiento deben ser determinadas caso a caso por el Médico Veterinario tratante, de acuerdo a la gravedad de los síntomas, utilizándose la dosis efectiva más baja. En caso de uso de dosis altas, preferir administrar a través de dos tomas diarias. Evitar el término abrupto del tratamiento. Para esto, preferir retiro paulatino, disminuyendo la dosis de forma progresiva e instaurando una terapia de días alternos.

Monitorear la aparición de signos relacionados a los efectos secundarios de los corticoides.

Utilizar con precaución en gatos jóvenes o de edad avanzada, obesos, hipertensos, inmunocomprometidos, con enfermedades crónicas, o que presenten desnutrición u obesidad.

## CONTRAINDICACIONES

No utilizar en hembras preñadas, lactancia o animales reproductores.

No utilizar en cuadros de infecciones virales o micóticas sistémicas.

No utilizar en animales con úlceras gastrointestinales, úlceras corneales o glaucoma.

No utilizar en animales con Diabetes Mellitus o en cuadros de Hiperadrenocorticismo.

No utilizar en animales con disfunción cardíaca.

No vacunar animales que hayan recibido terapia con Prednisolona, 2 a 3 semanas previo a la vacunación, dependiendo de la dosis administrada y duración del tratamiento.

No utilizar en caso de hipersensibilidad al principio activo.





## EFFECTOS ADVERSOS Y REACCIONES ADVERSAS

Se ha observado adelgazamiento de la dermis y epidermis, atrofia folicular, hematomas de aparición fácil y pobre cicatrización de heridas.

En casos extremos, la fragilidad de la piel puede llegar a tal punto que incluso la manipulación puede causar desgarros. Existen otros efectos adversos menos frecuentes como Diabetes Mellitus, crisis hipoadrenal, Hiperadrenocorticismos, debilidad, pérdida de masa muscular, alteración de parámetros sanguíneos y bioquímicos, hepatopatía inducida por Glucocorticoides, falla cardíaca congestiva, poliuria, polidipsia, polifagia, retención de líquidos, hipokalemia, calcinosis cutánea, baja resistencia a infecciones, úlceras pépticas, inhibición del crecimiento longitudinal de huesos, pancreatitis, disminución de hormonas tiroideas, aumento de hormonas paratiroideas y enroscamiento del pabellón auricular.

## CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Mantener a temperatura ambiente, entre 15 y 30 °C, en lugar seco y protegido de luz solar.

## PRESENTACIÓN

Envase con 10 comprimidos.

**Venta bajo Receta Médico Veterinaria.**

## USO VETERINARIO

FT0184NAC16022022R1V1

