

# KERTESIN®

Prednisolona 20 mg

Antiinflamatorios - Comprimidos Orales

REG. SAG Nº 1716



## COMPOSICIÓN

Cada comprimido de 600 mg contiene:

Prednisolona	20 mg
Excipientes c.s.p.	1 comprimido

## ESPECIES DE DESTINO

Perros y Gatos.

## INDICACIONES DE USO

Procesos inflamatorios y alérgicos donde esté indicado el uso de glucocorticoides. Enfermedades autoinmunes (Lupus eritematoso, enfermedades penfigoideas). Coadyuvante en la terapia antineoplásica (neoplasias linfoides).

## DOSIFICACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

### Dosificación:

**Perros:** Terapia de sustitución: 0,25 mg de prednisolona/kg/día, equivalente a  $\frac{1}{2}$  comprimido por cada 40 kg de peso. En estado de estrés aumentar la dosis 2 a 5 veces. Restringir la terapia de sustitución sólo en perros sobre 20 kg de peso.

Procesos inflamatorios y alérgicos: 0,5 - 1 mg de prednisolona/kg/día, equivalente a  $\frac{1}{2}$  y 1 comprimido, respectivamente, por cada 20 kg de peso. En tratamientos prolongados se debe realizar la terapia en días alternos. Este tratamiento evita la supresión del eje hipotálamo-hipófisis-adrenal, permitiendo la recuperación en los días en que no se administra la prednisolona.

**Perros y gatos:** Enfermedades autoinmunes y coadyuvante de terapia antineoplásica: 2 - 4 mg de prednisolona/kg/día, equivalente a  $\frac{1}{2}$  y 1 comprimido, respectivamente, por cada 5 kg de peso.

**Esquema terapéutico:** 0,5 a 1 mg de prednisolona/kg/12 horas (dosis de inducción), equivalente a  $\frac{1}{2}$  y 1 comprimido, respectivamente, por cada 20 kg de peso, por 5 a 7 días. Continuar con 1 - 2 mg de prednisolona/kg una vez al día cada 48 horas durante 7 días. Se continúa reduciendo semanalmente la cantidad de prednisolona (siempre días alternos) hasta llegar a una dosis mínima de mantenimiento, pero de efecto terapéutico buscado. No interrumpir en forma súbita la administración, sino gradualmente.

**Vía de administración:** Vía oral.

## ADVERTENCIAS

### Mantener fuera del alcance de los niños.

La interrupción súbita de la administración de Prednisolona puede provocar el Síndrome de Addison (hipoadrenocorticismo).

La terapia a largo plazo en dosis altas puede provocar el Síndrome de Cushing (hiperadrenocorticismo), concomitante con una insuficiencia adrenal secundaria.

## CONTRAINDICACIONES

No usar en pacientes con úlceras gastrointestinales, úlceras corneales, e hiperadrenocorticismo, así como tampoco en enfermedades infecciosas bacterianas, virales y micóticas.

No administrar en hembras gestantes.

## CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Mantener a temperatura ambiente, entre 15 y 30 °C, en un lugar seco y protegido de la luz solar.

**Venta bajo Receta Médico Veterinaria.**

## USO VETERINARIO

## PRESENTACIÓN

Envase con 10 comprimidos.

FT0134NAC23082019R1/V1

