

KORALEN® 10%

Ketoprofeno 10%

AINE – Solución Inyectable

REG. SAG Nº 1716

COMPOSICIÓN

Cada 100 mL de producto contienen:

Ketoprofeno 10 g
Excipientes c.s.p. 100 mL



Antiinflamatorio

ESPECIES DE DESTINO

Caballos, Bovinos y Cerdos.

INDICACIONES DE USO

Tratamiento de condiciones inflamatorias y dolorosas de los huesos y articulaciones, y del sistema músculo esquelético en caballos. Tratamiento sintomático del cólico en caballos. Adyuvante a la terapia antibiótica, en el tratamiento de condiciones inflamatorias, dolorosas y/o febriles, principalmente del sistema respiratorio y glándula mamaria en bovinos y cerdos.

DOSIFICACIÓN, VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y MODO DE EMPLEO

Dosificación:

Caballos: 2 - 3 mg de Ketoprofeno/kg de peso vivo/día (equivalente a 1 - 1,5 mL de Koralen® 10%/50 kg de peso vivo/día, respectivamente), durante 3 a 5 días consecutivos, vía endovenosa.

Bovinos: 3 mg de Ketoprofeno/kg de peso vivo/día (equivalente a 3 mL de Koralen® 10%/100 kg de peso vivo/día), hasta por 3 días consecutivos, vía endovenosa o intramuscular en tren posterior.

Cerdos: 3 mg de Ketoprofeno/kg de peso vivo/día (equivalente a 3 mL de Koralen® 10%/100 kg de peso vivo/día), durante 1 a 3 días consecutivos, vía intramuscular en la tabla del cuello.

Vía de administración:

Caballos: Vía endovenosa.

Bovinos: Vía endovenosa o intramuscular, en tren posterior.

Cerdos: Vía intramuscular, en la tabla del cuello.

Modo de empleo:

Agitar bien antes de usar.

Administrar en forma aséptica.

Vía intramuscular en bovinos: No administrar más de 10 mL por punto de inoculación, en animales adultos. En terneros, administrar 2,5 a 5 mL por punto de inoculación, según el peso del animal.

Vía intramuscular en cerdos: No administrar más de 5 mL por punto de inoculación, en animales adultos. En lechones, administrar hasta 1 mL por punto de inoculación, según el peso del animal.

Cuando se exceda esa cantidad por animal, deberá inyectarse en otro punto.

ADVERTENCIAS Y CONTRAINDICACIONES

Mantener fuera del alcance de los niños.

No administrar en casos de hipersensibilidad conocida a Ketoprofeno.

No administrar en animales con antecedentes de úlceras gastrointestinales.

No administrar en animales con enfermedad hepática y/o renal severa.

No administrar en hembras preñadas o durante la lactancia de los potrillos, terneros o lechones.

No administrar en gestación avanzada.

No administrar en conjunto con otros antiinflamatorios no esteroidales (AINES) o con corticoides.

EFFECTOS ADVERSOS Y REACCIONES ADVERSAS

Ketoprofeno parece ser seguro en caballos y su uso en esta especie puede tener menos incidencia de efectos adversos que los registrados con Fenilbutazona o Flunixinolona.

Potencialmente en cualquier especie podría ocurrir daño de la mucosa gástrica, ulceración gastrointestinal, necrosis renal y hepatitis leve.



CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Mantener a temperatura ambiente: a no más de 25 °C, en un lugar seco y protegido de la luz solar. No refrigerar ni congelar. Conservar en su envase original, bien cerrado.

Una vez abierto el producto, utilizar dentro de 28 días y mantener bajo las mismas condiciones de almacenamiento mencionadas anteriormente.

PERIODO DE RESGUARDO

Bovinos y Cerdos: Carne, 4 días.

Caballos: No administrar en animales destinados a consumo humano.

Venta bajo Receta Médico Veterinaria.

USO VETERINARIO

PRESENTACIONES

Frascos de 50 y 100 mL.

FT0060NAC04102023R3V2

