

LINESPEC® 22 – 22

Antibióticos – Polvo Oral

REG. SAG N° 1438 - B

COMPOSICIÓN

Cada 100 g de producto contienen:

Lincomicina clorhidrato (Equivalente a 2,2 g de Lincomicina base)	2,49 g
Espectinomina sulfato tetrahidratada (Equivalente a 2,2 g de Espectinomina base)	3,33 g
Excipientes c.s.p.	100 g



ANTIBIÓTICOS

ESPECIES DE DESTINO

Cerdos y Aves (Pollos broiler).

INDICACIONES DE USO

Cerdos: Indicado para el tratamiento de cuadros producidos por *Escherichia coli*, *Salmonella* spp., y *Haemophilus* spp. También en casos de neumonías producidas por *Mycoplasma* spp., y otras neumonías bacterianas.

Pollos broiler: Indicado para el tratamiento de cuadros respiratorios producidos por *Mycoplasma* spp., y cuadros complicados de *Escherichia coli*, Aerosaculitis, y brotes de Coriza y Clostridiosis.

DOSIFICACIÓN, VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y MODO DE EMPLEO

Dosificación:

Cerdos: 2 a 4 mg de Lincomicina base/kg de peso vivo/día + 2 a 4 mg de Espectinomina base/kg de peso vivo/día (equivalente a 2,3 a 4,5 mg de Lincomicina clorhidrato/kg de peso vivo/día + 3,0 a 6,1 mg de Espectinomina sulfato tetrahidratada/kg de peso vivo/día), por 7 días.

La dosis práctica calculada corresponde a: 2,5 a 3,0 kg de Linespec® 22-22/tonelada de alimento (equivalente a 110 a 132 ppm), por 7 días.

Pollos broiler: 11 a 16 mg de Lincomicina base/kg de peso vivo/día + 11 a 16 mg de Espectinomina base/kg de peso vivo/día (equivalente a 12,5 a 18,1 mg de Lincomicina clorhidrato/kg de peso vivo/día + 16,7 a 24,2 mg de Espectinomina sulfato tetrahidratada/kg de peso vivo/día), por 7 días.

La dosis práctica calculada corresponde a: 4,5 kg de Linespec® 22-22/tonelada de alimento (equivalente a 198 ppm), por 7 días.

Vía de administración: Vía oral, en el alimento.

Modo de empleo: Para asegurar una correcta dosificación, se debe considerar el consumo de alimento según especie y etapa de desarrollo del animal a medicar, la proporción del alimento medicado en la ración diaria, y la frecuencia y duración del tratamiento. El consumo de alimento depende de la situación clínica del animal y de la época del año. La administración del alimento medicado deberá realizarse en comederos destinados únicamente para el tratamiento de los animales enfermos.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

Mantener fuera del alcance de los niños.

De acuerdo a las buenas prácticas de uso, se recomienda administrar el producto basado en pruebas de susceptibilidad. Utilizar inmediatamente una vez preparado. Descartar la mezcla (alimento medicado) sobrante.



LINESPEC[®] 22 – 22

Antibióticos – Polvo Oral

CONTRAINDICACIONES, EFECTOS ADVERSOS Y REACCIONES ADVERSAS

No administrar a animales con hipersensibilidad conocida a Lincomicina o Espectinomicina.

No utilizar en otras especies que no sean las indicadas, especialmente conejos, hámster, caballos y rumiantes.

No administrar en hembras preñadas o durante la lactancia de los lechones.

Los cerdos pueden presentar reblandecimiento de las heces durante los 2 primeros días del tratamiento, lo que se corrige por sí solo.

PERIODO DE RESGUARDO

Cerdos: 6 días.

Aves (Pollos broiler): 6 días.

No administrar a gallinas en postura, cuyos huevos sean destinados a consumo humano.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Mantener a temperatura ambiente: a no más de 25 °C, en un lugar seco y protegido de la luz solar. No refrigerar ni congelar. Conservar en su envase original, bien cerrado.

PRESENTACIÓN

Envases de 25 kg.

USO VETERINARIO

Venta bajo Receta Médico Veterinaria.

