



MICRODES[®] PLUS

Antiparasitarios – Solución Inyectable

REG. SAG N° 1474 - B

COMPOSICIÓN

Cada 100 mL de producto contienen:

Ivermectina	1 g
Clorsulón	10 g
Excipientes	c.s.p. 100 mL



ESPECIES DE DESTINO

Bovinos.

INDICACIONES DE USO

Para el tratamiento y control de parásitos internos tales como: nematodos gastrointestinales (*Haemonchus* spp., *Ostertagia* spp., *Oesophagostomum* spp., *Trichostrongylus* spp., *Cooperia* spp., *Nematodirus* spp., *Bunostomum* spp., *Strongyloides* spp., *Trichuris* spp., y *Chabertia ovina*), parásitos pulmonares como *Dictyocaulus* spp., trematodos adultos de *Fasciola hepatica*, y para el tratamiento y control de parásitos externos tales como: piojos chupadores (*Haematopinus* spp., y *Linognathus* spp.), piojos masticadores (*Bovicola* (*Damalinea*) *bovis*) y ácaros de la sarna (*Psoroptes* spp., y *Sarcoptes* spp.).

DOSIFICACIÓN, VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y MODO DE EMPLEO

Dosificación:

Administrar 200 µg de Ivermectina/kg de peso vivo y 2 mg de Clorsulón/kg de peso vivo, equivalente a 1 mL de Microdes[®] Plus cada 50 kg de peso vivo.

Vía de administración: Vía subcutánea.

Modo de empleo:

Agitar bien antes y durante su uso.

Administrar en forma aséptica.

No administrar más de 10 mL por punto de inoculación, en bovinos adultos. En terneros, administrar 2,5 a 5 mL por punto de inoculación, según el peso del animal.

Cuando se exceda esa cantidad por animal, deberá inyectarse en otro punto.

ADVERTENCIAS

Mantener fuera del alcance de los niños.

CONTRAINDICACIONES

No administrar en animales con hipersensibilidad conocida a los principios activos.

No administrar por vía endovenosa o intramuscular.

No administrar en vacas en producción de leche.

No administrar en terneros menores a 3 meses de edad.

No administrar en otras especies animales, ya que pueden producirse reacciones severas, incluso la muerte en perros.

No administrar en animales debilitados.

EFFECTOS ADVERSOS Y REACCIONES ADVERSAS

Ocasionalmente podría presentarse inflamación y dolor leve a moderado en el sitio de inyección, lo cual resuelve sin tratamiento.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Mantener a temperatura ambiente: a no más de 25 °C, en un lugar seco y protegido de la luz solar. No refrigerar ni congelar. Conservar en su envase original, bien cerrado.

Una vez abierto el producto, utilizar dentro de 28 días y mantener bajo las mismas condiciones de almacenamiento mencionadas anteriormente.

PERIODO DE RESGUARDO

Carne: 49 días.

No administrar en vacas cuya producción de leche esté destinada a consumo humano.

PRESENTACIONES

Frascos de 50, 100 y 500 mL.

Venta bajo Receta Médico Veterinaria.

USO VETERINARIO

FT0021NAC08082024R2V1

