

MIDORIL® 5%

Toltrazurilo 5%

Antiparasitarios – Suspensión Oral

Reg. SAG N° 2144

COMPOSICIÓN

Cada 100 mL de producto contiene:

Toltrazurilo	5 g
Excipientes c.s.p.	100 mL

ESPECIES DE DESTINO

Cerdos (lechones).

INDICACIONES DE USO

Control y tratamiento de los signos clínicos de coccidiosis en lechones por infestaciones de *Isoospora suis*.

DOSIFICACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Dosificación:

20 mg de Toltrazurilo por kilo de peso (equivalente a 0,4 mL de producto Midoril® 5%/kg de peso), entre el 3° y 6° día de edad del lechón.

Dosis única, administrada en una sola toma.

Vía de administración: Vía oral, directamente en el hocico del lechón, por ejemplo mediante el empleo de una jeringa (sin aguja), u otro dispositivo que permita la correcta administración/dosificación.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

Mantener fuera del alcance de los niños

Agitar antes de usar.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Mantener a temperatura ambiente, entre 15 y 30 °C, en un lugar seco y protegido de la luz solar.

PERIODO DE RESGUARDO

Cerdos: 77 días.

Venta bajo Receta Médico Veterinaria.

USO VETERINARIO

PRESENTACIÓN

Envases de 250 mL, 500 mL y 1L.

