

NEOPRINIL®

Eprinomectina 5 mg/mL

Antiparasitarios – Solución Tópica

REG. SAG N° 2444 - B

COMPOSICIÓN

Cada 1 mL de producto contiene:

Eprinomectina	5 mg
Excipientes c.s.p.	1 mL

ESPECIES DE DESTINO

Bovinos.

INDICACIONES DE USO

Tratamiento de infestaciones por parásitos sensibles a Eprinomectina, tales como:

Nematodos gastrointestinales (adultos y larvas L4): *Ostertagia ostertagi* (incluyendo larvas L4 inhibidas), *Ostertagia lyrata* (sólo adultos), *Haemonchus placei*, *Trichostrongylus axei*, *Trichostrongylus colubriformis*, *Cooperia* spp. (incluyendo L4 inhibidas), *Cooperia oncophora*, *Cooperia punctata*, *Cooperia pectinata*, *Bunostomum phlebotomum*, *Nematodirus helvetianus*, *Oesophagostomum radiatum*, *Oesophagostomum* spp. (sólo adultos), *Trichuris discolor* (sólo adultos).

Nematodos pulmonares: *Dictyocaulus viviparus* (adultos y L4).

Ácaros (Sarna): *Chorioptes bovis*, *Sarcoptes scabiei* var. bovis.

Piojos chupadores: *Linognathus vituli*, *Haematopinus eurysternus*, *Solenopotes capillatus*.

Piojos masticadores: *Damalinia (Bovicola) bovis*.

Mosca de los cuernos: *Haematobia irritans*.

El medicamento veterinario protege a los animales frente a reinfestaciones por:

- *Nematodirus helvetianus* por 14 días.
- *Trichostrongylus axei* y *Haemonchus placei* por 21 días.
- *Dictyocaulus viviparus*, *Cooperia oncophora*, *Cooperia punctata*, *Oesophagostomum radiatum* y *Ostertagia ostertagi* por 28 días.

DOSIFICACIÓN, VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y MODO DE EMPLEO

Dosificación: 500 µg Eprinomectina/kg de peso vivo (equivalente a 1 mL de Neopriniil®/ 10 kg de peso vivo), dosis única.

Vía de administración: Tópica.

Modo de empleo:

- Aplicar la solución a lo largo de la línea media de la espalda, en una estrecha franja entre la cruz y el nacimiento de la cola.
- Para asegurar la administración de una dosis correcta, se debe determinar el peso vivo lo más exactamente posible.
- Si los animales se deben tratar conjuntamente, se deben agrupar según su peso vivo y ser dosificados en grupo, con el fin de evitar una sub y sobredosificación.
- Todos los animales pertenecientes al mismo grupo se deben tratar al mismo tiempo.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

Mantener fuera del alcance de los niños.

Sólo para uso externo.

No aplicar el medicamento veterinario en áreas cubiertas con barro o estiércol.

El medicamento veterinario se debe aplicar solamente en piel sana.

Para disminuir el riesgo de presentación de resistencia, se recomienda:

- Evitar el uso frecuente y repetido de antihelmínticos de la misma clase, durante un periodo de tiempo prolongado.
- Evitar la subdosificación del producto: determinar el peso corporal de la manera más precisa posible, calibrar el dispositivo de dosificación y aplicar el producto según indicaciones.



NEOPRINIL®

Eprinomectina 5mg/mL

Antiparasitarios – Solución Tópica

CONTRAINDICACIONES

No usar en otras especies animales. Las Avermectinas pueden causar muerte en perros, especialmente en Collies, Pastor Inglés, otras razas semejantes y sus cruza, así como en tortugas.

No administrar por vía oral o parenteral.

No usar en animales con hipersensibilidad conocida a la sustancia activa.

EFFECTOS ADVERSOS Y REACCIONES ADVERSAS

Se han observado reacciones transitorias de lamido, fasciculaciones en el sitio de administración, y reacciones locales leves como la presencia de caspa y escamas en el lugar de administración.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Mantener a temperatura ambiente, entre 15 y 30 °C, en un lugar seco y protegido de la luz solar.

Una vez abierto, utilizar dentro de 18 meses.

PERIODO DE RESGUARDO

Carne: 10 días.

Leche: 0 días.

PRESENTACIONES

1 L y 2,5 L.

Venta bajo Receta Médico Veterinaria

USO VETERINARIO

