

POULTRYSTAR® SOL

Simbiótico

Monografía de Proceso SAG N°2488/2011, 2770/2016

COMPOSICIÓN

Mezcla de cepas probióticas y prebióticas fructo-oligosacáridos (FOS).

ESPECIES DE DESTINO

Aves.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

PoultryStar® sol es un producto simbiótico multi-cepa que promueve la microflora intestinal benéfica a través de una acción combinada de microorganismos probióticos cuidadosamente seleccionados y prebióticos fructo-oligosacáridos.

INDICACIONES

Está indicado para mejorar la salud intestinal de las aves y para hacer a los pollitos de un día de edad y a las aves de todas las edades más resistentes a los patógenos, lo que conlleva a mejores parámetros de rendimiento. Su aplicación es recomendada particularmente a pollitos de un día, aves que han recibido terapias antibióticas y en periodos donde los animales están expuestos al estrés.

DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Administración vía oral a través del agua de bebida.

Aplicación intermitente: En pollitos de 1 día de edad, o después de terapias con antibióticos, o en cambios de alimentación. Dosis de 20 g/1000 aves/día, durante tres días consecutivos.

Uso en pollitos recién nacidos. Aplicación en el agua de bebida o vía spray.

Día 1:

Aplicación spray: Use la dosis de 20 g/1000 aves/día. Prepare una solución disolviendo lentamente en forma constante 20 g de **PoultryStar® sol** en 200 mL de agua tibia. Rocíe uniformemente la solución sobre todas las aves.

Aplicación en agua de bebida: Use la dosis de 20 g/1000 aves/día. Prepare una solución madre disolviendo lentamente en forma constante 20 g de **PoultryStar® sol** en 500 mL de agua tibia. Posteriormente, añada esta solución en el agua requerida para las 1000 aves en un día.

Día 2 y 3:

Aplicación en agua de bebida: Use la dosis de 20 g/1000 aves/día.

Aplicación continua: En otras fases de estrés. Use la dosis de 2 g/100 aves/día, diariamente.

Administración vía oral a través del alimento.

PoultryStar® sol se puede mezclar directamente en el alimento que no sea sometido a tratamiento térmico agresivo (peletizado o extruido).

Dosis: 20 - 100 g/tonelada de alimento, dependiendo de la intensidad del desafío bacteriano.

PERIODO DE RESGUARDO

No tiene.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Mantener en un lugar fresco y seco protegido de la luz solar.

Estabilidad: 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

PRESENTACIÓN

Envase de aluminio de 300 g

USO VETERINARIO

FT0027NAC03072019R1V2

