

PRIMAVET® 50%

Amoxicilina 50%

Antibióticos - Polvo Oral

Reg. SAG N° 1514 - B

COMPOSICIÓN

Cada 100 g de producto contiene:

Amoxicilina trihidrato	57,4 g
(Equivalente a 50 g de Amoxicilina base)	
Excipientes c.s.p.	100 g

ESPECIES DE DESTINO

Pollos broiler y Cerdos.

INDICACIONES DE USO

Pollos broiler: Para el tratamiento de la Estafilococosis y Estreptococosis Aviar (*Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp.), Cólera Aviar (*Pasteurella multocida*), Coriza Infecciosa (*Avibacterium* (*Haemophilus*) *paragallinarum*), Colibacilosis Aviar (*Escherichia coli*), y la Salmonelosis y Paratífosis Aviar (*Salmonella* spp.).

Cerdos: Para el tratamiento de la Estafilococosis y Estreptococosis Porcina (*Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp.), enfermedades respiratorias bacterianas (*Pasteurella* spp.), Colibacilosis Porcina (*Escherichia coli*), Salmonelosis Porcina (*Salmonella* spp.) y la Pleuroneumonía Porcina (*Actinobacillus pleuropneumoniae*).

DOSIFICACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Dosificación:

Pollos broiler: 20 mg de Amoxicilina base/kg de peso vivo/día, equivalente a 40 mg de Primavet® 50%/kg de peso vivo/día, durante 5 a 7 días.

Cerdos: 20 mg de Amoxicilina base/kg de peso vivo/día, equivalente a 40 mg de Primavet® 50%/kg de peso vivo/día, durante 5 a 7 días.

Vía de administración: Vía oral, en el agua de bebida.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

Mantener fuera del alcance de los niños.

Emplear con cuidado en animales con insuficiencia renal y/o hepática.

En caso de sobredosis puede existir diarrea y vómitos con la consecuente deshidratación. De presentarse estos signos, proveer prebióticos e hidratación.

Utilizar inmediatamente una vez preparado. Descartar la solución sobrante.

De acuerdo a las buenas prácticas de uso, se recomienda administrar el producto basado en pruebas de susceptibilidad.

CONTRAINDICACIONES

No administrar en animales con hipersensibilidad conocida a las Penicilinas (hipersensibilidad cruzada).

No administrar en animales con disfunción renal grave.

No administrar en hembras preñadas o durante la lactancia de los lechones.

No administrar en animales reproductores.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Mantener a temperatura ambiente, entre 15 y 30 °C, en un lugar seco y protegido de la luz solar.

PERIODO DE RESGUARDO

Cerdos: 2 días.

Pollos broiler: 2 días.

Venta bajo Receta Médico Veterinaria.

USO VETERINARIO

PRESENTACIÓN

Envases de 10 kg (contiene sachets de 100 g o 1 kg)

PROHIBIDA SU VENTA FRACCIONADA.

