

QUINAFISH®

Emamectina benzoato 0,2%
Antiparasitario – Polvo Oral

REG. SAG N° 1381

COMPOSICIÓN

Cada 100 g de producto contienen:

Emamectina benzoato 0,2 g
Excipientes c.s.p. 100 g

ESPECIES DE DESTINO

Trucha y Salmón.

INDICACIONES DE USO

Para el control y tratamiento de infestaciones con *Caligus rogercresseyi* en salmón y trucha. Quinafish® elimina todos los estadios de los ectoparásitos: *chalmus*, pre-adultos y adultos, con inclusión de hembras ovígeras.

DOSIFICACIÓN, VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y MODO DE EMPLEO

Dosificación:

50 µg Emamectina benzoato/kg de pez/día, durante 7 días consecutivos.

Vía de administración:

Vía oral, en el alimento.

Modo de empleo:

Para asegurar una correcta dosificación, se debe considerar el consumo de alimento según especie y etapa de desarrollo del animal a medicar, la proporción del alimento medicado en la ración diaria, y la frecuencia y duración del tratamiento. El consumo de alimento depende de la situación clínica del animal y de la época del año.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

Mantener fuera del alcance de los niños.

Utilizar inmediatamente una vez preparado. Descartar la mezcla (alimento medicado) sobrante.

CONTRAINDICACIONES

No descritas.

EFFECTOS ADVERSOS Y REACCIONES ADVERSAS

No se han descrito.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Mantener a temperatura ambiente: a no más de 30 °C, en un lugar seco y protegido de la luz solar. No refrigerar ni congelar.

PERIODO DE RESGUARDO

Realizar solo un tratamiento dentro de los 60 días previos al inicio de la cosecha.

PRESENTACIONES

Frasco con 1 kg y caja con 10 kg de producto.

Venta bajo Receta Médico Veterinaria Retenida.

USO VETERINARIO

