



VIRBAC RABIGEN®

Vacunas – Suspensión Inyectable

REG. SAG N° 2276 – B

COMPOSICIÓN

Cada dosis de 1 mL contiene:

Virus rábico, Cepa VP12 \geq 1 U.I.

Excipientes c.s.p. 1 mL

Inactivante: β -propiolactona

Adyuvante: Hidróxido de aluminio

ESPECIES DE DESTINO

Perros y Gatos.

INDICACION DE USO

Indicado como ayuda en la prevención de la rabia en perros y gatos sanos.

DOSIFICACIÓN, EDAD, VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y MODO DE EMPLEO

Dosis: 1 mL.

Edad o peso: A partir de las 12 semanas de edad.

Frecuencia, intervalo y duración del tratamiento: Aplicar a partir de las 12 semanas de edad. Se recomienda revacunación anual.

Vía de administración: Inyección subcutánea.

Modo de empleo: Agitar antes de usar. Administrar en forma aséptica.

CONTRAINDICACIONES Y EFECTOS ADVERSOS

No administrar en animales que muestren signos de rabia o que se sospeche que puedan estar infectados con el virus de la rabia.

No usar en hembras gestantes ni lactantes.

Se pueden presentar, en el sitio de inyección, reacciones locales y transitorias.

En muy raras ocasiones la vacunación puede inducir vómitos.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Vacunar únicamente animales sanos.

Se recomienda desparasitación 10 días antes de la vacunación.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Mantener refrigerado: entre 2°C y 8°C. No congelar.

PRESENTACIÓN

Envase conteniendo 10 frascos de 1 dosis de 1 mL.

USO VETERINARIO

Venta solo a Médicos Veterinarios.

Vacunas – Suspensión Inyectable

FT0115NAC13082024R3V3

Fabricado por:
Virbac S.A.
1ère Avenue 2065 m L.I.D. – 06510
Carros, Francia.

Importado y distribuido en Chile por:
Centrovet Ltda.
Av. Los Cerrillos 602, Cerrillos – Santiago.
www.virbac.cl
e-mail: virbac_chile@virbac.cl
Bajo licencia de Virbac S.A., Francia

