



VIRBAC RILEXINE®

Cefalexina 15%

Antibióticos – Suspensión Inyectable

REG. SAG N° 1428 – B

COMPOSICIÓN

Cada mL contiene:

Cefalexina (monohidrato)	150 mg
Excipientes c.s.p	1 mL



Antibióticos

ESPECIES DE DESTINO

Bovinos, Cerdos, Ovinos, Caprinos, Perros y Gatos.

INDICACIONES DE USO

Para el tratamiento de infecciones respiratorias, urogenitales, gastrointestinales y de piel producidas por bacterias sensibles al principio activo, tales como:

Bacterias Gram positivas y bacterias Gram negativas tales como: *Escherichia coli*, *Klebsiella pneumoniae*, *Proteus mirabilis*, *Micrococcus* spp., *Erysipelothrix* spp., *Salmonella* spp., *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus pneumoniae*, *Haemophilus influenzae*, *Moraxella (Branhamella) catarrhalis*, *Pasteurella* spp., *Actinomyces bovis*, *Clostridium* spp., *Fusobacterium* spp., *Staphylococcus epidermis*, *Streptococcus pyogenes*.

DOSIFICACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Dosificación:

Bovinos: 1 mL por cada 15 - 20 kg de peso (equivalente a 10-7,5 mg Cefalexina/kg de peso).

Cerdos, Ovinos, Caprinos, Perros y Gatos: 1 mL por cada 15 kg de peso (equivalente a 10 mg Cefalexina / kg de peso).

Los tratamientos deben repetirse cada 24 horas por tres días consecutivos

Vía de administración: Administrar por vía subcutánea o intramuscular.

ADVERTENCIAS, CONTRAINDICACIONES, USO DURANTE PREÑEZ Y LACTANCIA E INTERACCIÓN CON OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS

Mantener fuera del alcance de los niños

No administrar en animales con hipersensibilidad conocida a las Penicilinas, sus derivados sintéticos y Cefalosporinas.

No administrar por vía intravenosa.

No administrar en hembras preñadas ni en lactancia.

No administrar en animales reproductores.

Se recomienda no utilizar en forma concomitante con otros productos farmacéuticos.

Una vez abierto el producto, utilizar dentro de 28 días y mantener bajo las mismas condiciones de almacenamiento mencionadas más adelante.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Mantener a temperatura ambiente: a no más de 30 °C, en un lugar seco y protegido de la luz solar. No refrigerar ni congelar. Conservar en su envase original, bien cerrado.

PERÍODO DE RESGUARDO

Carne: 4 días.

Leche: 1 día (bovinos).

No administrar en ovinos y caprinos en lactancia cuya leche se destine a consumo humano.

Venta bajo Receta Médico Veterinaria.

USO VETERINARIO

PRESENTACIÓN

Frascos de 10, 20, 50, 100 y 250 mL.

FT0049NAC16022024R2V4

Fabricado por
Virbac México S.A. de C.V.
Av. Inglaterra N° 5070, Guadalajara
Technology Park C.P. 45010
Zapopan, Jalisco, México.

Importado y distribuido por
Centrovet Ltda.
Av. Los Cerrillos 602; Cerrillos, Santiago - Chile.
www.virbac.cl

