



# VIRBAMEC® F

Ivermectina 1% + Clorsulón 10%

Antiparasitarios – Solución Inyectable

REG. SAG N° 1575-B

## COMPOSICIÓN

Cada 1 mL de producto contiene:

Ivermectina	10 mg
Clorsulón	100 mg
Excipientes c.s.p.	1 mL

## ESPECIES DE DESTINO

Bovinos.

## INDICACIONES DE USO

Indicado para el control de los siguientes parásitos internos y externos en bovinos:

**Parásitos gastrointestinales (formas adultas y estados larvarios)**

*Ostertagia ostertagi*, *Ostertagia lyrata*, *Haemonchus contortus*, *Haemonchus placei*, *Trichostrongylus axei*, *Trichostrongylus colubriformis*, *Cooperia pectinata*, *Cooperia oncophora*, *Cooperia punctata*, *Bunostomum phlebotomum*, *Nematodirus helvetianus* (adulto), *Nematodirus* spp., *Oesophagostomum* spp., y *Trichuris ovis*.

**Parásitos pulmonares**

*Dictyocaulus viviparus* (incluyendo formas inhibidas).

**Trematodos**

*Fasciola hepática* (adulta).

**Ectoparásitos**

**Piojos:** *Linognathus vituli*, *Haematopinus eurysternus*, *Solenopotes capillatus*.

**Acaros:** *Psoroptes communis* var. *bovis*, *Sarcoptes scabiei* var. *bovis*.

## DOSIFICACIÓN, VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y MODO DE EMPLEO

Dosificación y duración del tratamiento: Administrar 1 mL cada 50 kg/p.v., en dosis única.

Vía de administración: Vía subcutánea.

Modo de empleo: Agitar antes de usar. Administrar en forma aséptica. Dividir las dosis mayores de 10 mL y aplicar en sitios de inyección diferentes.

## ADVERTENCIAS

No administrar por vía intramuscular ni endovenosa.

**Mantener fuera del alcance de los niños.**

Una vez abierto el producto, utilizar dentro de 28 días y mantener bajo las mismas condiciones de almacenamiento mencionadas más adelante.

## CONTRAINDICACIONES

No administrar en animales con hipersensibilidad conocida a los principios activos.

No administrar durante la lactancia.

No administrar a otras especies animales, ya que pueden producirse reacciones severas, incluso la muerte en perros.

## EFFECTOS NO DESEADOS Y REACCIONES ADVERSAS

Se puede presentar una inflamación transitoria en el sitio de inoculación, la cual remite sin necesidad de tratamiento.

## CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Mantener a temperatura ambiente: a no más de 30 °C, en un lugar seco y protegido de la luz solar. No refrigerar ni congelar. Conservar en su envase original, bien cerrado.

## PERÍODO DE RESGUARDO

Carne: 49 días.

No administrar en vacas cuya leche sea destinada al consumo humano.

## PRESENTACIÓN

Fascos de 10, 20, 50, 100, 200, 500 y 1000 mL.

**Venta bajo Receta Médico Veterinaria**

**USO VETERINARIO**



Antiparasitarios

FT0125NAC31052024R3V3

Fabricado por  
Laboratorios Virbac México S.A. de C.V.  
Av. Inglaterra 5070 Interior A, Guadalajara  
Technology Park  
C.P. 45010 Zapopan, Jalisco, México.

Importado y distribuido por  
Centrovet Ltda.  
Av. Los Cerrillos 602, Cerrillos, Santiago - Chile

