

VACUNA INACTIVADA HEPATITIS CON CUERPOS DE INCLUSIÓN

Suspensión Inyectable

Reg. SAG N°0091-B

COMPOSICIÓN

Cada dosis de 0,5 mL contiene:

Adenovirus aviar tipo I, Serotipo 4, Cepa VHClO1

Excipientes c.s.p.

Adyuvante: Hidróxido de Aluminio

Inactivante: Formaldehído

$\geq 10^{5.5}$ D_{IE₅₀}/ dosis
0,5 mL



Vacunas

PROPIEDADES INMUNOLÓGICAS

Vacuna inactivada destinada a desarrollar inmunidad activa contra Adenovirus aviar tipo I, serotipo 4.

ESPECIE DE DESTINO

Pollos broiler y pollas de reposición de aves comerciales y reproductoras.

INDICACIONES DE USO

Como ayuda a la prevención de los cuadros de Hepatitis con Cuerpos de Inclusión.

DOSIS, VÍA (S) DE ADMINISTRACIÓN Y MODO DE EMPLEO

Vacuna para aplicación intramuscular o subcutánea, en las siguientes dosis:

Aves menores de 4 semanas: 0,2 mL

Aves mayores de 4 semanas: 0,5 mL

Aplicar la 1ª dosis durante la primera semana de vida. En el caso de ponedoras y reproductoras, aplicar una segunda dosis 21 días después de la primera, y un refuerzo un mes antes de iniciar el período productivo.

CONTRAINDICACIONES

No administrar en aves que estén cursando la enfermedad o algún cuadro inmunosupresor. No usar durante la postura.

EFFECTOS NO DESEADOS O REACCIONES ADVERSAS

No se han observado efectos adversos.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

Agitar los frascos antes y durante su uso.

Una vez abierto, utilizar todo el contenido del envase.

Mantener este producto fuera del alcance de los niños.

INTERACCIÓN CON OTRAS VACUNAS Y MEDICAMENTOS CUANDO SON ADMINISTRADOS EN COMBINACIÓN CON EL PRODUCTO

No existe información disponible respecto de la seguridad y eficacia para el uso concomitante con otros productos farmacéuticos, por lo cual no se recomienda administrar otros productos 14 días previos y posteriores a la inmunización.

SOBREDOSIS

Se recomienda el uso de la dosis recomendada, aun cuando no se han observado efectos indeseables en pollos vacunados con el doble de la dosis. Se recomienda no sobredosificar a las aves.

PERIODO DE RESGUARDO

42 días.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL OPERADOR

En caso de inyección accidental, solicitar asistencia médica.

PRINCIPALES INCOMPATIBILIDADES

No diluir, mezclar o coadministrar con ningún producto farmacéutico.

PERIODO DE EFICACIA (ESTABILIDAD)

18 meses a partir de la fecha de elaboración

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Mantener la vacuna a temperatura de refrigeración, entre 2 y 8 °C. No congelar.

NATURALEZA Y COMPOSICIÓN DE LOS ENVASES

Frasco plástico de polietileno de alta densidad, inyectable multidosis de 250 mL, con tapón de goma y sello de aluminio.

ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO SIN USAR O DE DESECHO

Se recomienda la incineración como método de eliminación de los envases y desechos. No conservar frascos con remanente de producto no utilizado.

Venta bajo receta Médico Veterinaria

USO VETERINARIO

FT0081NAC21012014R2V3

