

VETERIN® 30%

Florfenicol 30%

Antibióticos - Solución Inyectable

REG. SAG N° 1439

COMPOSICIÓN

Cada 100 mL de producto contiene:

Florfenicol	30 g
Excipientes c.s.p.	100 mL

ESPECIES DE DESTINO

Bovinos y Cerdos.

INDICACIONES DE USO

Para el tratamiento de enfermedades del aparato respiratorio causadas por bacterias sensibles al principio activo, tales como: *Mannheimia (Pasteurella) haemolytica*, *P. multocida*, *Haemophilus spp.*, *Mycoplasma spp.*, *Bordetella bronchiseptica*, *Actinobacillus pleuropneumoniae* y *Streptococcus suis*, entre otras.

DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Dosificación:

Bovinos: 20 mg de Florfenicol/kg peso vivo (equivalente a 0,067 mL de Veterin® 30%/kg peso vivo). Repetir a las 48 horas.

Cerdos: 15 mg de Florfenicol/kg peso vivo (equivalente a 0,05 mL de Veterin® 30%/kg peso vivo). Repetir a las 48 horas.

Vía de administración: Vía intramuscular.

Modo de empleo:

Agitar bien antes de usar. Administrar en forma aséptica.

Calcular la cantidad necesaria de producto a utilizar, según el peso vivo del animal.

Administrar el producto vía intramuscular, específicamente a nivel de la musculatura del cuello.

No administrar más de 10 mL por punto de inoculación, en bovinos adultos. En terneros, administrar 2,5 a 5 mL por punto de inoculación, según el peso del animal.

No administrar más de 5 mL por punto de inoculación, en cerdos adultos. En lechones, administrar hasta 1 mL por punto de inoculación, según el peso del animal.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

Mantener fuera del alcance de los niños.

De acuerdo a las buenas prácticas de uso, se recomienda administrar el producto basado en pruebas de susceptibilidad.

Una vez abierto el producto, utilizar dentro de 30 días y mantener bajo las mismas condiciones de almacenamiento mencionadas más adelante.

CONTRAINDICACIONES

No administrar a animales con hipersensibilidad conocida a Florfenicol.

No usar en animales con alteración hepática o renal.

No usar en animales deshidratados o hipovolémicos, por riesgo de toxicidad renal.

No administrar en hembras preñadas o durante la lactancia de terneros o lechones.

No administrar en animales reproductores.

EFFECTOS ADVERSOS Y REACCIONES ADVERSAS

Bovinos: Reacciones adversas transitorias, tales como: anorexia, disminución del consumo de agua y diarrea, podrían ocurrir posterior tratamiento inyectable con Florfenicol.

Cerdos: La principal reacción adversa posterior al tratamiento parenteral con Florfenicol, corresponde a la presencia de inflamación perianal y/o eversión del recto. La ocurrencia de estos casos puede ser alta (50% o más), sin embargo, éstos son de tipo transitorios y con hasta una semana de duración.



Para ambos casos, reacciones transitorias de irritación local en el sitio de inyección podrían ser observadas, las cuales pueden ser más severas ante una inyección en otro sitio distinto al indicado. De esta manera, lo recomendado es inyectar el producto sólo a nivel de la musculatura del cuello, para evitar pérdidas de tejido comestible.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Mantener a temperatura ambiente, entre 15 y 30 °C, en un lugar seco y protegido de la luz solar.

PERIODO DE RESGUARDO

Bovinos y Cerdos (carne): 30 días.

No administrar en vacas cuya producción de leche sea destinada a consumo humano.

PRESENTACIÓN

Envases de 50 mL, 100 mL y 250 mL.

Venta bajo Receta Médico Veterinaria.

USO VETERINARIO

FT0126NAC14122020R2V1

