

VIRBAC MILPRO® 16 MG/40 MG.

Milbemicina oxima 16 mg + Praziquantel 40 mg.

Antiparasitario – Comprimido Oral.

REG. SAG N° 2458 - B

COMPOSICIÓN

Cada comprimido contiene
Milbemicina Oxima 16 mg
Praziquantel 40 mg
Excipientes c.s.p. 1 Comprimido

ESPECIE DE DESTINO

Gatos mayores de 2 kg de peso

INDICACIONES DE USO

Para el tratamiento de la infestación endoparasitaria mixta de cestodos (*Dipylidium caninum* y *Echinococcus multilocularis*) y nematodos (*Ancylostoma tubaeforme* y *Toxocara cati*).

DOSIFICACIÓN, VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y MODO DE EMPLEO

Dosificación:

La dosis corresponde a 2 mg de Milbemicina oxima y 5 mg de Praziquantel/kg peso corporal. La dosis de producto según peso del gato, es la siguiente:

Peso (KG)	Nº de comprimidos
2 - 4 kg	1/2 comprimido
>4 - 8 kg	1 comprimido
>8 - 12 kg	1 1/2 comprimidos

La frecuencia de administración es en dosis única de tratamiento.

Vía de administración: Vía oral

Modo de empleo:

Se debe administrar la cantidad necesaria de comprimidos, de acuerdo al peso del animal, en una sola toma y en conjunto o posterior a la comida. Para facilitar su administración los comprimidos cuentan con un recubrimiento sabor a carne.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

Mantener fuera del alcance de los niños.

Ante la ausencia de estudios específicos, no se recomienda su uso en gatos severamente debilitados ni con grave disfunción hepática o renal.

CONTRAINDICACIONES

No usar en gatos con un peso menor a 2 kg.
No administrar a animales hipersensibles a Milbemicina oxima o Praziquantel.

USO DURANTE PREÑEZ, LACTANCIA Y EN ANIMALES REPRODUCTORES:

El producto puede ser utilizado en gestación y lactancia.
No utilizar en animales reproductores.

EFFECTOS ADVERSOS Y REACCIONES ADVERSAS

En muy raras ocasiones (y en especial en gatos jóvenes), signos de tipo sistémicos (como: letargia), neurológicos (como: temblor muscular y ataxia) y/o gastrointestinales (como: vómitos y diarrea), podrían observarse posterior a la administración del producto.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Mantener a temperatura ambiente, entre 15 y 30 °C, en un lugar seco y protegido de la luz solar.
En caso de utilizar 1/2 comprimido, mantener la otra mitad dentro de su envase original hasta su próximo uso, por un periodo máximo de 6 meses.

PRESENTACION

Estuche con 1 blíster conteniendo 2 comprimidos.

Venta Bajo Receta Medico Veterinaria.

USO VETERINARIO

