

ZANIL® 10%

Oxitetraciclina 10%

Antibióticos - Polvo Oral

Reg. SAG N° 1890-B

COMPOSICIÓN

Cada 100 g de producto contiene:

Oxitetraciclina dihidrato	10,78 g
(Equivalente a 10,0 g de Oxitetraciclina base)	
Excipientes c.s.p.	100 g

ESPECIES DE DESTINO

Aves (Pollos broiler) y Cerdos.

INDICACIONES DE USO

Aves (pollos broiler): Para el tratamiento y control del Cólera Aviar (*Pasteurella multocida*), Enfermedad Respiratoria Crónica, Aerosaculitis (*Mycoplasma gallisepticum* y *Escherichia coli*), y Sinovitis Infecciosa (*Mycoplasma synoviae*).

Cerdos: Para el tratamiento y control de la enteritis bacteriana (*Escherichia coli* y *Salmonella* spp.), cuadros neumónicos (*Pasteurella multocida*, *Actinobacillus pleuropneumoniae* y cepas susceptibles de *Mycoplasma* spp.), y Leptospirosis (*Leptospira* spp.).

DOSIFICACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Dosificación:

Aves (pollos broiler): 20 a 59 mg de Oxitetraciclina base/kg de peso vivo/día (equivalente a 200 a 590 mg de Zanil® 10%/kg de peso vivo/día), por 7 a 14 días.

Cerdos:

Enteritis bacteriana y cuadros neumónicos: 22 mg de Oxitetraciclina base/kg de peso vivo/día (equivalente a 220 mg de Zanil® 10%/kg de peso vivo/día), por 7 a 14 días.

Leptospirosis: 20 - 30 mg de Oxitetraciclina base/kg de peso vivo/día (equivalente a 200 a 300 mg de Zanil® 10%/kg de peso vivo/día), por 14 días continuos.

Vía de administración: Vía oral, en el alimento.

ADVERTENCIAS Y CONTRAINDICACIONES

Mantener fuera del alcance de los niños.

En aves se pueden utilizar acidificantes en el alimento, para mejorar la absorción de Oxitetraciclina.

De acuerdo a las buenas prácticas de uso, se recomienda administrar el producto basado en pruebas de susceptibilidad.

No administrar conjuntamente con sales polivalentes (calcio, magnesio, cobre, hierro).

No administrar en animales con hipersensibilidad conocida a las Tetraciclinas.

No administrar en animales con alteración hepática y/o renal.

No administrar en hembras preñadas o en lactancia, o en aves de postura.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Mantener a temperatura ambiente, entre 15 y 30 °C, en un lugar seco y protegido de la luz solar.

PERIODO DE RESGUARDO

Aves (pollos broiler): 7 días.

No administrar en aves cuyos huevos sean destinados a consumo humano.

Cerdos: 10 días.

Venta bajo Receta Médico Veterinaria.

USO VETERINARIO

PRESENTACIÓN

Frasco de 1 kg y bolsas de 1 y 20 kg.

