



PRIMAVET® 50%

Amoxicilina 50%

Antibióticos - Polvo Oral

REG. SAG N° 1514 - B



Antibióticos

COMPOSICIÓN

Cada 100 g de producto contienen:

Amoxicilina trihidrato 57,4 g

(Equivalente a 50 g de Amoxicilina base)

Excipientes c.s.p. 100 g

ESPECIES DE DESTINO

Pollos broiler y Cerdos.

INDICACIONES DE USO

Pollos broiler: Para el tratamiento de la Estafilococosis y Estreptococosis Aviar (*Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp.), Cólera Aviar (*Pasteurella multocida*), Coriza Infecciosa (*Avibacterium* (*Haemophilus*) *paragallinarum*), Colibacilosis Aviar (*Escherichia coli*), y la Salmonelosis y Paratífosis Aviar (*Salmonella* spp.).

Cerdos: Para el tratamiento de la Estafilococosis y Estreptococosis Porcina (*Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp.), enfermedades respiratorias bacterianas (*Pasteurella* spp.), Colibacilosis Porcina (*Escherichia coli*), Salmonelosis Porcina (*Salmonella* spp.) y la Pleuroneumonía Porcina (*Actinobacillus pleuropneumoniae*).

DOSIFICACIÓN, VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y MODO DE EMPLEO

Dosificación:

Pollos broiler: 20 mg de Amoxicilina base/kg de peso vivo/día, equivalente a 40 mg de Primavet® 50%/kg de peso vivo/día, durante 5 a 7 días.

Cerdos: 20 mg de Amoxicilina base/kg de peso vivo/día, equivalente a 40 mg de Primavet® 50%/kg de peso vivo/día, durante 5 a 7 días.

Vía de administración: Vía oral, en el agua de bebida.

Modo de empleo:

RECOMENDACIONES PARA REALIZAR LA INCORPORACIÓN DEL MEDICAMENTO EN EL AGUA DE BEBIDA EN EL PLANTEL ANIMAL:

- Adicionar la cantidad de producto según la cantidad de animales a tratar y disolver en una fracción de agua de bebida a administrar, luego completar el total del volumen indicado. Este volumen deberá corresponder a un tercio (1/3) del total del consumo diario de agua de bebida estimado según edad, peso y condición climática.
- Se recomienda suspender el consumo de agua de bebida de los animales un par de horas antes de administrar el producto.
- La administración del producto deberá realizarse en bebederos destinados únicamente para el tratamiento de los animales enfermos. Suspender la administración de agua de bebida mediante bebederos automáticos, mientras dure la administración del medicamento.
- El medicamento deberá ser administrado en 1 toma y de acuerdo a la pauta horaria recomendada por el fabricante.
- Las soluciones se deben preparar diariamente, bajo la supervisión del Médico Veterinario y descartar los restos no utilizados.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

Mantener fuera del alcance de los niños.

Emplear con cuidado en animales con insuficiencia renal y/o hepática.

En caso de sobredosis puede existir diarrea y vómitos con la consecuente deshidratación. De presentarse estos signos, proveer prebióticos e hidratación.

Una vez abierto el sachet, utilizar inmediatamente y descartar el producto sobrante.

Utilizar inmediatamente una vez preparado. Descartar la solución sobrante.

De acuerdo a las buenas prácticas de uso, se recomienda administrar el producto basado en pruebas de susceptibilidad.

Fabricado y comercializado en Chile por Centrovét Ltda.

Av. Los Cerrillos 602, Cerrillos - Santiago.

www.virbac.cl

e-mail: virbac_chile@virbac.cl





PRIMAVET® 50%

Amoxicilina 50%

Antibióticos - Polvo Oral

Reg. SAG N° 1514 - B

CONTRAINDICACIONES

No administrar en animales con hipersensibilidad conocida a las Penicilinas (hipersensibilidad cruzada).

No administrar en animales con disfunción renal grave.

No administrar en hembras preñadas o durante la lactancia de los lechones.

No administrar en animales reproductores.

No administrar en aves durante la postura.

EFFECTOS ADVERSOS Y REACCIONES ADVERSAS

Puede presentarse anafilaxis aguda y reacciones de hipersensibilidad moderadas (urticaria, fiebre, edema angioneurótico), en animales susceptibles. Otro posible efecto adverso es la intolerancia gastrointestinal (anorexia, vómito y/o diarrea).

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Mantener a temperatura ambiente: a no más de 25 °C, en un lugar seco y protegido de la luz solar. No refrigerar ni congelar.

PERIODO DE RESGUARDO

Cerdos: 2 días.

Pollos broiler: 2 días.

Venta bajo Receta Médico Veterinaria.

USO VETERINARIO

PROHIBIDA SU VENTA FRACCIONADA.

PRESENTACIONES

Envase de 10 kg (conteniendo 100 sachets con 100 g de producto).

Envase de 10 kg (conteniendo 10 sachets con 1 kg de producto).

FT0039NAC28082024R2V3

Fabricado y comercializado en Chile por Centrovét Ltda.

Av. Los Cerrillos 602, Cerrillos - Santiago.

www.virbac.cl

e-mail: virbac_chile@virbac.cl

