

VETERIN® 50%

Antibióticos – Polvo Oral

Reg. SAG N° 1556

COMPOSICIÓN

Cada 100 g de producto contiene:

Florfenicol 50 g
Excipientes c.s.p. 100 g

ESPECIES DE DESTINO

Cerdos y Pollos broiler.

INDICACIONES

Cerdos y Pollos broiler: Tratamiento de patologías causadas por *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Pasteurella multocida*, *Bordetella bronchiseptica*, *Streptococcus suis*, *Haemophilus* spp., *Klebsiella pneumoniae*, *Lawsonia intracellularis*, *Salmonella* spp., y *Mycoplasma* spp.

DOSIFICACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Administración vía oral en el alimento.

Cerdos y Pollos broiler: 20 mg Florfenicol/kg p.v./día (equivalente a 40 mg Veterin® 50%/kg p.v.), durante 7 días consecutivos.

PERIODO DE RESGUARDO

Cerdos y Pollos broiler (carne): 30 días.

ADVERTENCIAS, CONTRAINDICACIONES, EFECTOS NO DESEADOS Y REACCIONES ADVERSAS

Mantener fuera del alcance de los niños.

De acuerdo a las buenas prácticas de uso, se recomienda administrar el producto basado en pruebas de susceptibilidad.

Cerdos y Aves: No administrar en hembras en gestación, o en machos que se utilicen con fines reproductivos, ya que provoca atrofia testicular.

Cerdos: Podría observarse diarrea, inflamación perianal y en raros casos, eversión rectal. Estos efectos son transitorios y se resuelven al cesar el tratamiento.

Aves: Podría observarse disminución del consumo de alimento, cuando se administra el producto en altas dosis.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Mantener a temperatura ambiente entre 15 y 30°C, en lugar un seco y protegido de la luz solar.

PRESENTACIÓN

Envases de 10 kg.

USO VETERINARIO

Venta bajo Receta Médico Veterinaria

