

# CEFALEXINA 15%

## Antibióticos - Suspensión Oral

Reg. SAG N° 2137 - B

### COMPOSICIÓN

Cada 100 mL de producto contiene:

Cefalexina monohidrato (Equivalente a 15,0 g de Cefalexina base)	15,78 g
Excipientes c.s.p.	100 mL



### ESPECIES DE DESTINO

Perros y Gatos.

### INDICACIONES DE USO

Indicado para el tratamiento de infecciones de la piel y tejidos blandos en perros y gatos, causadas por gérmenes sensibles a Cefalexina, tales como: *Pasteurella multocida*, *Staphylococcus aureus*, algunas cepas de *Staphylococcus intermedius*, *Staphylococcus epidermidis* y *Streptococcus* spp.

Para el tratamiento de infecciones urinarias causadas por *Klebsiella pneumoniae*; y para el tratamiento de osteomielitis causadas por patógenos sensibles en el perro.

### DOSIFICACIÓN, VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y MODO DE EMPLEO

#### Dosificación:

**Infecciones de la piel:** 15 - 30 mg de Cefalexina base/kg de peso corporal (equivalente a 0,1 - 0,2 mL de Cefalexina 15%/kg de peso corporal), cada 12 horas, en el perro y en el gato. Para el tratamiento de pioderma superficial, se sugiere continuar el tratamiento por 2 semanas después de la resolución de los signos clínicos, y en los cuadros de pioderma profundo, se recomienda un tratamiento de al menos 6 semanas.

**Osteomielitis:** 22 - 30 mg de Cefalexina base/kg de peso corporal (equivalente a 0,15 - 0,2 mL de Cefalexina 15%/kg de peso corporal), cada 8 horas, en el perro. Se recomienda un tratamiento de al menos 6 semanas.

**Infecciones urinarias:** 25 mg de Cefalexina base/kg de peso corporal (equivalente a 0,17 mL de Cefalexina 15%/kg de peso corporal), cada 8 horas en el perro, por 7 días y no más allá de 45 días.

Vía de administración: Vía Oral.

Modo de empleo: Es posible administrar Cefalexina con el alimento ya que no interfiere en su absorción.

### ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

#### Mantener fuera del alcance de los niños.

Agitar antes de usar.

Precaución frente al uso conjunto con Aminoglucósidos, diuréticos potentes (Ej. Furosemida), u otras sustancias nefrotóxicas.

Utilizar con precaución en pacientes con antecedentes de enfermedades renales, por el efecto nefrotóxico de las Cefalosporinas.

Una vez abierto, utilizar dentro de 30 días.

### CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad al principio activo.

No administrar en animales con insuficiencia renal severa.

No administrar en hembras preñadas o en lactancia.

### EFFECTOS NO DESEADOS Y REACCIONES ADVERSAS

Se pueden presentar los siguientes efectos y/o reacciones: diarrea, dolor abdominal, gastritis, ictericia, náuseas y vómitos. En caso de producirse, suspender el tratamiento y consultar al Médico Veterinario.

### CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Mantener a temperatura ambiente, entre 15 y 30° C, en un lugar seco y protegido de la luz solar.

### PRESENTACIÓN

Envase de 100 mL.

**USO VETERINARIO - Venta bajo Receta Médico Veterinaria**

FT0107NAC15072019R1V1

